

卷柏（卷柏）配方颗粒

Juanbai (Juanbai) Peifangkeli

【来源】本品为卷柏科植物卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 的干燥全草经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】取卷柏（卷柏）饮片 12000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 4.5%~8.3%），加入辅料适量，干燥（或干燥、粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微，味苦。

【鉴别】取本品 0.5g，研细，加甲醇 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇 3ml 使溶解，作为供试品溶液。另取卷柏（卷柏）对照药材 2g，加水 50ml，煎煮 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣自“加甲醇 50ml”起，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以异丙醇-浓氨试液-水（13:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2% 三氯化铝甲醇溶液，在 105℃ 加热数分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相 A，以 0.1% 磷酸溶液为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 260nm。理论板数按鸟苷峰计算应不低于 5000。


时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~5	0→1	100→99
5~15	1→1.5	99→98.5
15~25	1.5→5	98.5→95
25~61	5→14	95→86

参照物溶液的制备 取卷柏（卷柏）对照药材 1.5g，加水 50ml，加热回流 30 分钟，放冷，离心，取上清液浓缩至近干，残渣加 30% 甲醇 5ml 使溶解，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取尿苷对照品、鸟苷对照品适量，精密称定，加 30% 甲醇制成每 1ml 各含 50 μ g 的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同〔含量测定〕项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各5 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应，其中峰1、峰3应分别与尿苷、鸟苷对照品参照物峰保留时间相对应。与尿苷参照物峰相对应的峰为S峰，计算峰2、峰4~峰6与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的 $\pm 10\%$ 范围之内，规定值为：1.07（峰2）、3.33（峰4）、3.97（峰5）、4.35（峰6）。



对照特征图谱

峰 1 (S)：尿苷 峰 3：鸟苷

【检查】应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2020 年版通则 0104）。

【浸出物】取本品适量，研细，取约 3g，精密称定，精密加入乙醇 100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 20.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相 A，以水为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 252nm。理论板数按鸟苷峰计算应不低于 5000。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~30	1→5	99→95

对照品溶液的制备 取鸟苷对照品适量，精密称定，加30%甲醇制成每1ml含50 μ g的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率1130W，频率37kHz）15分钟，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含鸟苷（ $C_{10}H_{13}N_5O_5$ ）应为 1.3mg~5.0mg。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 12g。

【贮藏】 密封。

上海市中药配方颗粒质量标准