

花生衣配方颗粒

Huashengyi Peifangkeli

【来源】本品为豆科植物落花生 *Arachis hypogaea* L. 的干燥种皮经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】取花生衣饮片 7500g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 7.0%~13.3%），加入辅料适量，干燥（或干燥、粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】本品为浅红棕色至红棕色的颗粒；气微，味极涩。

【鉴别】取本品 0.5g，研细，加甲醇 30ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液浓缩至干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取花生衣对照药材 2g，加水 50ml，煎煮 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣自“加甲醇 30ml”起，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-甲醇-甲酸（4：1：1），预饱和 30 分钟为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。


色谱条件与系统适用性试验 同〔含量测定〕项。

参照物溶液的制备 取花生衣对照药材 0.5g，加 20%甲醇 10ml，超声处理（功率 300W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取 2-脱氧腺苷-5-单磷酸对照品、腺苷对照品、鸟苷对照品适量，精密称定，加水制成每 1ml 各含 20 μ g 的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同〔含量测定〕项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 2 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现 5 个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的 5 个特征峰保留时间相对应，其中峰 1~峰 3 应分别与 2-脱氧腺苷-5-单磷酸、腺苷、鸟苷对照品参照物峰保留时间相对应。与鸟苷参照物峰相对应的峰为 S 峰，计算峰 4、峰 5 与 S 峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的 \pm 10%范围以内，规定值为：1.18（峰 4）、1.46（峰 5）。



对照特征图谱

峰 1: 2-脱氧腺苷-5-单磷酸 峰 2: 腺苷 峰 3 (S): 鸟苷

【检查】应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2020 年版通则 0104）。

【浸出物】取本品适量，研细，取约 3g，精密称定，精密加入乙醇 100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 35.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相 A，以 0.2%甲酸溶液为流动 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 260nm。理论塔板数按鸟苷峰计算应不低于 10000。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~10	0	100
10~30	0→3	100→97

对照品溶液的制备 取鸟苷对照品适量，精密称定，加 20%甲醇制成每 1ml 含 20μg 的溶液，即得。

供试品溶液制备 取本品适量，研细，取约 0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 20%甲醇 10ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 300W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用 20%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各 2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含鸟苷（ $C_{10}H_{13}N_5O_5$ ）应为 0.28mg~1.0mg。

【规格】每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g。

【贮藏】密封。